

## Gravidade da infecção

1

**INFECÇÃO LEVE**  
(IDSA<sup>a</sup>) – IWGDF-PEDIS<sup>b</sup> 2

**Presença de pelo menos 2:**

- Edema local
- Hiperemia > 0,5 cm e < 2,0 cm
- Dor
- Aumento do calor local
- Exsudato purulento

Agentes orais



2

**INFECÇÃO MODERADA**  
(IDSA) - PEDIS 3/3 Osteomielite

- Infecção local: hiperemia > 2 cm **OU**
- Involvimento de estruturas mais profundas do que a pele e tecido subcutâneo
- Sem sinais de resposta inflamatória sistêmica

Agentes orais ou parenterais iniciais



3

**INFECÇÃO GRAVE**  
(IDSA)/PEDIS 4/4 Osteomielite

- Temperatura >38° C ou <36 °C
- Frequência cardíaca >90 batimentos por minuto
- Frequência respiratória > 20 incursões/minuto ou PaCO<sup>2</sup> < 32 mmHg (4,3 kPa)
- Leucograma >12,000/mm<sup>3</sup> ou <4,000/mm<sup>3</sup> ou >10% bastonetes

Agentes parenterais



## Características

## Antibióticos\*

\* Veja as recomendações das **Diretrizes sobre Infecção** para o regime de antibioticoterapia empírica para a infecção de pé diabético

## Apresentação clínica