

Eu tenho Hipoparatiroidismo

Meu nível de cálcio pode
ficar muito baixo.

Posso precisar de
tratamento de
emergência!

Acesse o QR Code
para saber mais



Este paciente não
produz hormônio
paratireoidiano (PTH) e está sob
risco de crises hipocalcêmicas graves.



Podem ocorrer formigamentos e cãibras, mas se o paciente apresentar tetania, desconforto respiratório, arritmia cardíaca, confusão mental e/ou convulsões pode significar que o cálcio está extremamente baixo (menor do que 7,0mg/dL) devendo ser realizada reposição endovenosa de cálcio da seguinte forma:

1 a 2 ampolas de gluconato de cálcio 10% diluídas em 50mL de SG 5% ou SF 0,9% por via endovenosa lentamente em 10 a 20 minutos.

Seguido por infusão de manutenção de 0,5 a 1,5 mg/kg/h por 8 a 10 horas concomitantemente à reintrodução de cálcio, calcitriol e colecalciferol, devido ao risco de surgimento dos sintomas acima descritos.

Nome completo:

Data de nascimento:

Endocrinologista responsável:

Hospital de referência/contato:

Contato de emergência:

Tratamento:

Cálcio oral (marca)

Comprimidos, vezes ao dia.

Calcitriol 0,25 mcg; comprimidos vezes ao dia.

Colecalciferol UI, vezes por dia semana

