

# Eu tenho Hipoparatiroidismo

Meu nível de cálcio pode  
ficar muito baixo.

Posso precisar de  
tratamento de  
**emergência!**

Acesse o QR Code  
para saber mais



**Este paciente não  
produz hormônio  
paratireoideiano (PTH) e está sob  
risco de crises hipocalcêmicas graves.**



Podem ocorrer formigamentos e câibras, mas se o paciente apresentar tetania, desconforto respiratório, arritmia cardíaca, confusão mental e/ou convulsões pode significar que o cálcio está extremamente baixo (menor do que 7,0mg/dL) devendo ser realizada reposição endovenosa de cálcio da seguinte forma:

1 a 2 ampolas de gluconato de cálcio 10% diluídas em 50mL de SG 5% ou SF 0,9% por via endovenosa lentamente em 10 a 20 minutos.

Seguido por infusão de manutenção de 0,5 a 1,5 mg/kg/h por 8 a 10 horas concomitantemente à reintrodução de cálcio, calcitriol e colecalciferol, devido ao risco de surgimento dos sintomas acima descritos.

Nome completo: .....

Data de nascimento: .....

Endocrinologista responsável: .....

Hospital de referência/contato: .....

Contato de emergência: .....

## Tratamento:

Calcio oral (marca) .....

..... Comprimidos, ..... vezes ao dia.

Calcitriol 0,25 mcg; ..... comprimidos ..... vezes ao dia.

Colecalciferol ..... UI, ..... vezes por  dia  semana

